



PREPARAZIONE PER ESAME BIOPTICO TRANS RETTALE

Revisione n.1
del 17/11/2015

Pag. 1/1

Da mostrare al proprio medico curante

Per eseguire l'esame in convenzione è indispensabile presentare tre impegnative:

1. **(88.79.G) Ecografia prostatica trans-rettale + (60.11) Agobiopsia ecoguidata della prostata** (da consegnare al C.M.S.R. al momento dell'esame).
 2. **(91.44.1) Esame istopatologico apparato genitale maschile da agobiopsia prostatica con quantità n. 6 [QTA = 6].** (da consegnare al servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Vicenza o di Arzignano insieme alle provette che contengono il prelievo istologico).
 3. **(91.44.1) Esame istopatologico apparato genitale maschile da agobiopsia prostatica con quantità n. 6 [QTA = 6].** (da consegnare al servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Vicenza o di Arzignano insieme alle provette che contengono il prelievo istologico).
- Orari Laboratorio **VICENZA**: accettazione materiale Anatomia e Istologia Patologica di Vicenza dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 16.00 ed il sabato dalle ore 7.30 alle 12.00.
 - Orari Laboratorio **ARZIGNANO**: Il servizio di Anatomia Patologica di Arzignano è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 ed il giovedì dalle ore 14.00 alle 15.00.

Se consegnati il giorno successivo all'esame, i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente

Una scrupolosa preparazione è necessaria per garantire le minori possibilità di complicanze.

- La mattina del giorno prima dell'esame cominciare la profilassi antibiotica con CIPROFLOXACINA 500 mg – 2 confezioni da 6 compresse ciascuna (1 compressa due volte al giorno, mattina e sera). La profilassi va proseguita per altri cinque giorni, anche DOPO l'esame, fino all'esaurimento delle compresse.
- Per i pazienti in terapia anticoagulante, sospendere l'uso del farmaco in modo da ottenere un INR minore di 1,5 la mattina dell'esecuzione dell'esame. Presentarsi con il risultato dell'analisi.
- Per i pazienti in terapia antiaggregante sospendere la terapia una settimana prima.
- Esecuzione di un accurato clistere di pulizia il più vicino possibile al tempo dell'esame.
- Bere due bicchieri d'acqua un'ora prima dell'esame e trattenere l'urina.
- Accurata pulizia della regione anale.
- In caso di comparsa di febbre alta con brivido scuotente è necessaria la somministrazione di flebocortid 500mg/ev e sostituzione della terapia con ciprofloxacina con piperacillina 2gx3 i.m.e gentilyn 80 mg i.m.x3 per 5 giorni.

IL PAZIENTE DEVE PORTARE CON SE' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MEDICA IN SUO POSSESSO RELATIVA AD ACCERTAMENTI PRECEDENTI

Il mancato rispetto delle precedenti indicazioni può rendere impossibile l'effettuazione dell'esame.

PROMEMORIA PER IL SIG. _____

DATA DELL'APPUNTAMENTO : _____ **ORE** _____

PRIMA COMPRESSA LA MATTINA DEL _____