



## PREPARAZIONE PER ESAME BIOPTICO TRANS RETTALE

Revisione n.2  
del 22/10/2018

Pag. 1/1

### Da mostrare al proprio medico curante

#### **Per eseguire l'esame in convenzione è indispensabile presentare tre impegnative:**

1. **(88.79.G) Ecografia prostatica trans-rettale + (60.11) Agobiopsia ecoguidata della prostata** (da consegnare al C.M.S.R. al momento dell'esame).
  2. **6 righe con codice (91.44.1) Esame istopatologico apparato genitale maschile da agobiopsia prostatica con quantità n. 1 [QTA=1]** (da consegnare al servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Vicenza o di Arzignano insieme alle provette che contengono il prelievo istologico).
  3. **6 righe con codice (91.44.1) Esame istopatologico apparato genitale maschile da agobiopsia prostatica con quantità n. 1 [QTA=1]** (da consegnare al servizio di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Vicenza o di Arzignano insieme alle provette che contengono il prelievo istologico).
- **Orari Laboratorio VICENZA: accettazione materiale Anatomia e Istologia Patologica di Vicenza dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 16.00 ed il sabato dalle ore 7.30 alle 12.00.**
  - **Orari Laboratorio ARZIGNANO: Il servizio di Anatomia Patologica di Arzignano è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 ed il giovedì dalle ore 14.00 alle 15.00.**

Se consegnati il giorno successivo all'esame, i campioni devono essere conservati a temperatura ambiente

Una scrupolosa preparazione è necessaria per garantire le minori possibilità di complicanze.

- **La mattina del giorno prima dell'esame cominciare la profilassi antibiotica con CIPROFLOXACINA 500 mg – 2 confezioni da 6 compresse ciascuna (1 compressa due volte al giorno, mattina e sera). La profilassi va proseguita per altri cinque giorni, anche DOPO l'esame, fino all'esaurimento delle compresse.**
- **Per i pazienti in terapia anticoagulante, sospendere l'uso del farmaco in modo da ottenere un INR minore di 1,5 la mattina dell'esecuzione dell'esame. Presentarsi con il risultato dell'analisi.**
- **Per i pazienti in terapia antiaggregante sospendere la terapia una settimana prima.**
- **Esecuzione di un accurato clistere di pulizia il più vicino possibile al tempo dell'esame.**
- **Bere due bicchieri d'acqua un'ora prima dell'esame e trattenere l'urina.**
- **Accurata pulizia della regione anale.**
- **In caso di comparsa di febbre alta con brivido scuotente è necessaria la somministrazione di flebocortid 500mg/ev e sostituzione della terapia con ciprofloxacina con piperacillina 2gx3 i.m.e gentilyn 80 mg i.m.x3 per 5 giorni.**

**IL PAZIENTE DEVE PORTARE CON SE' TUTTA LA DOCUMENTAZIONE MEDICA IN SUO POSSESSO RELATIVA AD ACCERTAMENTI PRECEDENTI**

**Il mancato rispetto delle precedenti indicazioni può rendere impossibile l'effettuazione dell'esame.**

PROMEMORIA PER IL SIG. \_\_\_\_\_

**DATA DELL'APPUNTAMENTO :** \_\_\_\_\_ **ORE** \_\_\_\_\_

PRIMA COMPRESSA LA MATTINA DEL \_\_\_\_\_